

Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat Roaccutan szedő  
nőbetegek részére

Az Ön akne betegsége olyan jellegű, hogy egy nagyhatású szer, a Roaccutan szedése javasolt. A gyógyszer adagja egyénileg, az Ön betegségére szabottan kerül megállapításra, ezért annak pontos megtartása feltétlenül szükséges.

Röviddel a kúra megkezdése után bőrtünetei átmenetileg kissé romolhatnak, azonban ezt követően a gyulladásos tünetek fokozatosan javulnak.

A gyógyszer szedése alatt leggyakrabban bőr- és nyálkahártyaszárazság (szájnyalkahártyán, kötőhártyán, orrnyálkahártyán és ajkon) lép fel, ami biztos jele annak, hogy "hat" a gyógyszer. Ezek a mellékhatások tünetileg kezelhetők és a kúra után maguktól maradéktalanul rendeződnek.

A Roaccutan súlyos magzatkárosító hatása, ezért rendkívül fontos, hogy fogamzóképes korban levő nőbeteg esetében a terhességet kizárjuk. A biztonságos fogamzásgátlásról gondoskodni kell legalább 4 héttel a kúra megkezdése előtt és még 8 hétig a kúra befejezése után. Így elkerülhető a magzati fejlődési rendellenességek kialakulása.

Nem javasolt a Roaccutan szedés ideje alatt A-vitamin vagy ezt tartalmazó multivitamin, továbbá tetracyclin antibiotikum szedése.

A gyógyszer szedése alatt ne tartózkodjék hosszabb ideig napon.

Ha kontaktlencsét visel, a kúra ideje alatt lehetőség szerint cserélje fel szemüveggel.

Esetleges fejfájás, látászavar, hányinger, hasmenés, izom és ízületi panaszok esetén haladéktalanul értesítse kezelőorvosát.

A fenti mellékhatásokat illetve a szükséges óvintézkedéseket tudomásul vettem, fogamzásgátlásról gondoskodom. Amennyiben mégis terhesség lépne fel a gyógyszeres kúra ideje alatt, orvosomat haladéktalanul értesítem. A fenti kezelésbe beleegyezem.

Dátum \_\_\_\_\_

.....  
Beteg aláírása

.....  
Orvos aláírása